

sanofi pasteur

A divisão vacinas do Grupo sanofi-aventis



**PREVINA-SE CONTRA
FEBRE TIFÓIDE**





DOENÇA

A Febre Tifóide é uma doença bacteriana aguda, causada pela *Salmonella typhi* e está relacionada a baixos níveis sócio-econômicos, de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental.⁽¹⁾

O modo de **transmissão** da doença é por via fecal-oral, principalmente, através da ingestão de **água ou de alimentos** contaminados com fezes humanas ou com urina contendo a *S. typhi*. Pode ser transmitida também pelo contato direto (mão-boca) com fezes, urina, secreção respiratória, vômito ou pus de um indivíduo infectado.⁽⁴⁾


Este indivíduo pode eliminar a bactéria, nas fezes e na urina, por um período de até 3 meses, independentemente de apresentar os sintomas da doença. Portadores crônicos podem **transmiti-la por até um ano.**⁽⁴⁾



Estima-se que, a cada ano, ocorram **22 milhões** de casos e 200.000 mortes em todo o mundo.⁽²⁾

No Brasil, a doença ainda é endêmica e as maiores taxas de notificação da Febre Tifóide são registradas nas regiões **Norte** (7.886) e **Nordeste** (39.918), onde os estados mais críticos são Bahia e Amazonas, com um total de 19.356 e 2.831 casos, respectivamente.⁽³⁾

**DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOS,
POR UNIDADE FEDERADA. BRASIL, 1980 - 2005***





SINAIS E SINTOMAS

Doença que se caracteriza por febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, diarreia e tosse seca, podendo aparecer manchas rosadas no tronco.⁽¹⁾

COMPLICAÇÕES

As complicações mais comuns são enterorragia e perfuração intestinal, que geralmente ocorrem em pessoas não tratadas.⁽⁴⁾


PRINCIPAIS CONDUTAS DE PREVENÇÃO

Ferver ou filtrar a água antes de consumi-la, prevenir-se com higiene pessoal, saneamento básico e preparo adequado dos alimentos, evitar alimentação na rua e, se necessário, dar preferência a pratos preparados na hora, por fervura, e servidos ainda quentes.⁽¹⁾



PREVENÇÃO ATRAVÉS DA VACINAÇÃO

A vacinação contra febre tifóide é recomendada para pessoas sujeitas a exposições excepcionais como os trabalhadores que entram em contato com esgotos, para aqueles que ingressem em zonas de alta endemicidade como por ocasião de viagem, e ainda, para quem vive em áreas onde a incidência é comprovadamente alta.⁽⁶⁾ Por esse motivo, **consulte sempre seu médico!**



FONTE: www.who.int/wer

REFERÊNCIAS: **1.** MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coordenação de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar – COVEH. Tópicos de Saúde – Febre Tifóide. Disponível em: http://portalweb05.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=21894 (Acessado em 09/01/2008). **2.** Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - SES/SP; Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD; Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE; Centro de Vigilância Sanitária – CVS; Instituto Adolfo Lutz – IAL e Instituto de Infectologia Emílio Ribas – IIER. Manual das doenças transmitidas por alimentos e água - Salmonella typhi/Febre Tifóide. Disponível em: http://www.cve.saude.sp.gov.br/hm/hidrica/if_510FT.html (Acessado em 08/01/2008). **3.** A. Fraser et al. Typhoid fever vaccines: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Vaccine* 2007; 25: 7848-57. **4.** MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coordenação de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar – COVEH. Tópicos de Saúde – Febre Tifóide. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=21888 (Acessado em 09/01/2008). **5.** ALECRIM, Wilson Duarte, LOUREIRO, Adalgisa Câmara de Sá Peixoto, MORAES, Ricardo Silva et al. Febre tifóide: recaída por resistência antimicrobiana. Relato de caso. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.*, vol.35, nº 6, p. 661-663; nov./dez. 2002. **6.** Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde (Centro Nacional de Epidemiologia) - Guia de vigilância epidemiológica. Disponível em: http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Tuberculose/Aulas/guia_vigilancia_epidemiologica.pdf (acessado em 13/02/2008).



sanofi aventis

O essencial é a saúde .

515868

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200. Ed. Atlanta. Jd. Morumbi
CEP 05693-000 - São Paulo - SP - CNPJ no 24.040.487/0001-02.
www.sanofipasteur.com.br - SIV 0800 148480 / SAC 0800 119020

Para mais informações consulte seu médico.